

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор ТОВ «Лабораторія антисептики»



**ІНСТРУКЦІЯ**  
**щодо застосування дезінфікуючого засобу «ЛАСЕПТ 344»**  
**на підприємствах хлібопекарської промисловості та**  
**підприємствах, що**  
**виробляють кондитерські вироби**

**Харків-2013**



## Державна санітарно-епідеміологічна служба України

### СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ДЕЗІНФЕКЦІЙНОГО ЗАСОБУ

№ 05.03.02-08/527

від 29.04.2013 р.

#### Дезінфекційний засіб „ЛАСЕПТ 344”

(назва дезінфекційного засобу)

%: 10,0-додецилбіспропілентриамін; 13,0- алкілдиметилбензиламонію хлорид; 7,0  
-дідекадиметиламонію хлорид

(вміст дієвих речовин)

ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ АНТИСЕПТИКИ", Україна, 61204, м. Харків, вул. Ахарова, 17, к.64,  
код ЄДРПОУ: 38279992

(заявник, повне найменування, місцезнаходження)

ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ АНТИСЕПТИКИ", Україна, 61204, м. Харків, вул. Ахарова, 17, к.64,  
код ЄДРПОУ: 38279992

(виробник, повне найменування, місцезнаходження)

призначений для поточного, заключного, профілактичної дезінфекції, проведення генеральних прибирань у лікувально-профілактических установах та вогнищах інфекційних захворювань, бактеріальній (включаючи туберкульоз), вірусній та грибкової етології; дезінфект виробів медичного призначення (включаючи хірургічні і стоматологічні інструменти, зокрема жорсткі і гнучкі ендоскопи та інструменти до них); дезінфект та очищення поверхонь приміщення, меблів, санітарного транспорту, близниць, посуду, предметів догляду за хворими, санітарно-технічного обладнання, прибраного інвентарю; клінічних, блохімічних, бактеріологічних, серологічних та інших профільних лабораторій; аптек і аптечних установ; оздоровчих закладах (санаторій, профілакторій, будинки відпочинку); на підприємствах харчової промисловості (маслозаводи, хлібні, молочні, м'ясної, рибної, підприємствах з виробництва напоїв; літакопереробних підприємствах тощо); ресторанного господарства і торговлі; споживчих ринках; транспорті (громадському, залізничному, морському, річковому, автомобільному), вокзалах, аеропортах, автостанціях, метрополітені; дезінфект систем кондиціонування повітря; дезінфект на комунальних об'єктах спортивно-оздоровчих установах, підліткових установах, хосписах, установах зв'язку, банківських установах, військових частинах, дошкільних та навчальних закладах; приміщення, обладнання, інструментів в перукарнях, косметичних салонах і кабінетах; розважальних комплексах; дезінфект та миття громадських туалетів і бітуалетів, баків для сміття, сміттєзвалищників.

(сфера застосування)

Згідно з методичними вказівками від 22.04.2013 №220-2013 та інструкцією що додаються

(використання згідно з)

Свідоцтво видане на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.04.2013 р.

№ 05.03.02-04/24362, проведеної уповноваженою установою, закладом державної санітарно-епідеміологічної служби

Державна Установа "Інститут медицини праці НАМН України"

(нова найменування установи/закладу)

Свідоцтво дійсне до: 30.04. 2018 року

Головний державний санітарний лікар  
України

М.П.



А.М. Пономаренко  
(німчані та прізвище)

## **Інструкція**

**щодо застосування дезінфікуючого засобу «ЛАСЕПТ 344»**

**на підприємствах хлібопекарської промисловості та підприємствах, що  
виробляють кондитерські вироби**

Інструкція призначена для персоналу підприємств хлібопекарської промисловості при проведенні дезінфекції поверхонь виробничих приміщень і устаткування, інвентарю, санітарно-технічного обладнання, дезінфекції поверхні яєць.

### **1. Загальні відомості**

1.1. «ЛАСЕПТ 344» - дезінфікуючий засіб виробництва ТОВ «Лабораторія антисептики» (ТУ У 20.2-3827992-001:2012), є прозорою рідиною від безбарвної до жовтого кольору із специфічним запахом, що добре змішується з водою. Містить у якості діючих речовин: додецилбіспропілентриамін – 10 %, алкілдиметилбензиламоній хлорид – 13,0 %, дидецилдиметиламоній хлорид – 7,0 %; у якості допоміжних речовин – комплексуторювач, інгібітор корозії та інші функціональні добавки – до 100 %.

Значення pH засобу «ЛАСЕПТ 344» складає 12+1. Засіб «ЛАСЕПТ 344» зберігає свої властивості після замерзання і подальшого відтанення. Засіб не викликає корозії, не фіксує органічні виділення, не знебарвлює тканини. Засіб не сумісний з милом, аніонними ПАР, синтетичними миочими засобами.

Дезінфікуючий засіб «ЛАСЕПТ 344» упакован в оригінальну тару підприємства-виробника: у полімерні флакони або пляшки 500 мл, 1000 мл або в поліетиленові каністри 5 л, 10 л. Термін зберігання засобу 3 роки з дня виготовлення.

1.2. Засіб «ЛАСЕПТ 344» має бактерицидні властивості щодо грамнегативних та грампозитивних бактерій (включаючи збудників туберкульозу), віруліцидні (включаючи віруси гепатитів, вірус СНІД/ВІЛ, поліоміеліту, віруси грипу, аденовіруса), фунгіцидні (включаючи гриби роду Кандида, дерматофіти, дріжджі).

Робочі розчини засобу ефективні при кімнатній температурі. При застосуванні робочих розчинів підвищеної температури (40-60 °C) їх антимікробні та миочі властивості значно підвищуються.

1.3. Робочі розчини засобу «ЛАСЕПТ 344» не пошкоджують вироби зі скла, пласти мас, гуми, металу, бетону, деревини, кахлю, шкіри, текстилю.

1.4. Засіб «ЛАСЕПТ 344» за параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 відноситься до 3 класу помірно небезпечних речовин при інгаляційному впливі; до 3 класу помірно небезпечних речовин при введенні в шлунок і до 4 класу малонебезпечних речовин при нанесенні на шкіру; при введенні в черевну порожнину засіб по класифікації К.К. Сидорова малотоксичний (4 клас токсичності). При інгаляційній дії засіб відноситься до малонебезпечних речовин по класифікації хімічних речовин за ступенем леткості. Засіб спричиняє помірну подразнюючу дію при контакті зі шкірою і виражену подразнюючу дію на слизові оболонки очей. Засіб не володіє шкірно-резорбтивною і сенсибілізуючою активністю. Не виявляє мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних і канцерогенних властивостей.

1.5. На підприємствах хлібопекарської, кондитерської промисловості та на об'єктах фірмової роздрібної торгівлі засіб «ЛАСЕПТ 344» застосовується для профілактичної дезінфекції та санітарної обробки приміщень, технологічного, холодильного та лабораторного обладнання, посуду, інвентарю, прилавків, вітрин, вагів, внутрішньої цехової та зворотної тари, палаток, касет,

санітарного одягу, санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю, транспорту для перевезення харчової сировини та готової продукції, а також для генеральних прибирань тощо.

## 2. Приготування робочих розчинів

2.1. Робочі розчини засобу «ЛАСЕПТ 344» готують перед використанням в спеціально виділеному посуді шляхом розведення водою. При цьому необхідно користуватись розрахунками, які наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Приготування робочих розчинів засобу «ЛАСЕПТ 344»

Концентрація «ЛАСЕПТ 344» (за препаратом), %	Кількість інгредієнтів, необхідна для приготування			
	1 л робочого розчину		10 л робочого розчину	
	об'єм засобу, мл	об'єм води, мл	об'єм засобу, мл	об'єм води, мл
0,2	2,0	998,0	20,0	9 980,0
0,4	4,0	996,0	40,0	9 960,0

2.2. Робочі розчини зберігають 15 діб з моменту приготування за умови зберігання у закритих смностях.

## 3. Застосування робочих розчинів

3.1. Дезінфекцію виробничого обладнання, посуду, інвентарю, тари, поверхні приміщень та інших об'єктів проводять після їх механічного очищення від залишків продуктів та миття із застосуванням миючих засобів після закінчення кожної зміни.

Для дезінфекції використовують робочі розчини засобу «ЛАСЕПТ 344» кімнатної або підвищеної температури ( $40^{\circ}\pm 5^{\circ}\text{C}$ ). Режими дезінфекції засобом вказані в таблиці 2.

3.2. Обробка устаткування, апаратури, інвентарю й тари дезінфікуючим засобом «ЛАСЕПТ 344» проводиться після закінчення кожної зміни та починається з механічного очищення від харчових залишків, знежирення шляхом миття гарячими службами миючими розчинами з подальшим промиванням гарячию водою. Потім продовжується у двосекційній ванні: у першій секції – замочування, мийка та дезінфекція інвентарю й тари 0,4 % (за препаратом) водним розчином «ЛАСЕПТ 344» протягом 15 хв. або 0,2 % протягом 30 хв. при температурі води  $+40\text{--}+45^{\circ}\text{C}$ ; у другій - промивання чистою проточною водою при температурі  $+40\text{--}+45^{\circ}\text{C}$  до повного змивання «ЛАСЕПТ 344». Контроль за якістю відмивання «ЛАСЕПТ 344» - п.8.

Устаткування й апаратура для молока, варочні котли для сиропу, баки для зберігання сиропу, міrnі бачки, трубопроводи дезінфікуються після кожного звільнення в наступному порядку:

- ополіскування чистою проточною водою при температурі  $+35\text{--}+40^{\circ}\text{C}$ ;
- ретельне миття за допомогою йоршів і щіток з використанням будь-якого дозволеного мийного засобу, зливання води;
- ополіскування чистою проточною водою при температурі  $+35\text{--}+40^{\circ}\text{C}$ ;
- заповнення смностей доверху й обробка 0,4 % (за препаратом) водним розчином «ЛАСЕПТ 344» протягом 15 хв. або 0,2 % 30 хв. при температурі  $+50^{\circ}\text{C}$ ;

- зливання розчину «ЛАСЕПТ 344» і промивання чистою проточною водопровідною водою при температурі +50- +60 °C трубопроводу протягом 15 хв., інших ємностей шляхом 2-3 кратного заповнення водою доверху й наступного зливання змивних вод у каналізацію.

3.3. Машина для збивання крему після механічного очищення від крему обробляється наприкінці кожної зміни в такий спосіб:

- заповнення доверху водою з додаванням будь-якого дозволеного мийного засобу й обробка протягом 10-15 хв. на повному ходу машини, зливання води;

- заповнення доверху 0,2 % (за препаратом) водним розчином «ЛАСЕПТ 344» (температура розчину +50 °C) і обробка протягом 30 хв. або 0,4 % 15 хв. на повному ходу машини, зливання розчину;

- змивання деззасобу шляхом 3-х кратного заповнення й зливання машини чистою водопровідною водою при температурі +50- +60 °C до повного змивання засобу «ЛАСЕПТ 344».

3.4. Столи, що використовуються для обробки тортів і тістечок, наприкінці кожної зміни обробляються шляхом протирання зволоженою спочатку чистою водою, а потім змоченими 0,4 % (за препаратом) розчином «ЛАСЕПТ 344» чистими ганчірками з експозицією 15 хв. або 0,2 % зекспозицією 30 хв., після обробки обполіскуються водою при температурі +40-45 °C до повного змивання засобу «ЛАСЕПТ 344», після чого ретельно протираються насухо чистим ганчір'ям.

3.5. Устаткування, тара, інвентар, використані для приготування яичної маси, після закінчення роботи ретельно промиваються 1 - 2 рази чистою водопровідною водою при температурі +35- +40 °C з додаванням мийних засобів, потім обполіскуються водопровідною водою, а потім заливаються доверху або занурюються в ємності з 0,2 % розчином «ЛАСЕПТ 344» (температура +50°C) і обробляються протягом 30 хв. або з 0,4 % протягом 15 хв. Після обробки розчин «ЛАСЕПТ 344» зливався, устаткування відмивається від засобу шляхом 1-2-х кратного заповнення й наступного зливання водопровідної води при температурі +45- +50 °C, а тара й інвентар відмиваються під проточною водою протягом 15 хв. при зазначеній температурі. Контроль за відмиванням «ЛАСЕПТ 344» - п 8.

3.6. Перед приготуванням яичної маси всі яйця, що попередньо підлягали овоскопії, перекладаються в гратчасті металеві коробки або відра, обробляються у двосекційній ванні в наступному порядку:

- у першій секції замочування, мийка та дезінфекція 0,2 % (за препаратом) водним розчином при температурі +40 -+45 °C протягом 20 хв.;

- у другій секції - промивання чистою проточною водою при температурі +40- +45 °C до повного зникнення засобу «ЛАСЕПТ 344».

Заміна розчинів у мийній ванні повинна проводитися не рідше 2 разів на зміну.

3.7. Поверхню стін (кахель), дверей на рівні 1,8 м щодня протирають ганчір'ям, зволоженим 0,2 % водним розчином «ЛАСЕПТ 344» при експозиції 40 хв., або 0,4 % при експозиції 20 хв з розрахунку 100-150 мл/м<sup>2</sup> оброблюваної площині.

3.8. Прибирання металевої підлоги проводиться щомісячно шляхом протирання ганчір'ям, змоченим 0,2 % (за препаратом) водним розчином «ЛАСЕПТ 344» при експозиції 40 хв. або 0,4 % при експозиції 20 хв.

3.9. Санвузли й приміщення для прийому їжі щодня обробляються 0,4 % (за препаратом) водним розчином «ЛАСЕПТ 344».

Поверхні приміщень та санітарно-технічне обладнання після дезінфекції не потребують ополіскування водою.

3.10. Дезінфекцію виробів з тканин (касет, санітарного одягу) здійснюється після їх попереднього прання шляхом занурення на 30 хвилин в робочий розчин засобу «ЛАСЕПТ 344» при температурі +40 - +60 °C в концентрації 0,4 %.

Обробка може бути також здійснена в пральній машині при додаванні відповідної кількості засобу «ЛАСЕПТ 344» в друге полоскання. При цьому температура розчину може бути більше 30 °C, час обробки 15 - 20 хвилин. Після закінчення обробки вироби з тканин полошуть і висушують.

3.11. Прибиральний матеріал (ганчірки, серветки) дезінфікують шляхом занурення у 0,4 % розчин засобу «ЛАСЕПТ 344» на 30 хв., інший інвентар (відра, тази, швабри та ін.) протирають ганчір'ям, змоченим у відповідному розчині.

Санітарна обробка транспорту для перевезення харчових продуктів здійснюється за методикою, яка викладена у "Санітарних правилах для предприятий продовольственной торговли" № 5781-91 від 16.04.91 р. При цьому, внутрішні поверхні кузова після миття та ополіскування дезінфікують 0,4 % розчином засобу «ЛАСЕПТ 344» 30 хв.

**Таблиця 2. Режим профілактичної дезінфекції робочими розчинами засобу «ЛАСЕПТ 344»**

Об'єкт обробки	Концентрація робочого розчину, (%)	Температура робочого розчину, (°C)	Час обробки, (хв.)	Спосіб обробки
Технологічні трубопроводи, а також обладнання, яке важко розбирати (змішувачі, кремово-збивальні машини тощо)	0,2 0,4	20-40 20-40	30 15	заповнення, розчином, за можливості здійснювати циркуляцію
Деталі та вузли технологічного обладнання, дрібний інвентар, тара та посуд				
з металів	0,2	40	30	занурення
з пластмас	0,2	40	30	занурення
з деревини	0,4	40	15	занурення
Поверхні приміщень (підлога, стіни, двері тощо), виробничих столів, технолого-гічного та торговельного обладнання, транспорту та ін.	0,2 0,4	20-40 20-40	40 20	нанесення щітками або розпилення, протирання
Санітарно-технічне обладнання	0,4	20	30	розпилення протирання
Касети, санітарний одяг	0,4	40-60	30	замочування
Прибиральний інвентар: ганчірки, серветки, відра, тази, швабри	0,4	20	30	замочування протирання
Автотранспорт	0,4	20-40	30	розпилення, протирання або нанесення щітками

#### **4. Запобіжні заходи**

4.1. До роботи із засобом «ЛАСЕПТ 344» не допускаються особи молодше 18 років та особи з підвищеною чутливістю до складових частин засобу.

4.2. Роботи з концентратом при виготовленні робочих розчинів потрібно виконувати з дотриманням заходів особистої гігієни (халат, шапочка, фартух з бавовняної тканини, гумові рукавички).

4.3. Під час проведення всіх робіт із дезінфекції слід дотримуватись правил особистої гігієни, забороняється палити, пити і приймати їжу. Після роботи обличчя і руки слід вимити водою.

4.4. Приміщення після дезінфекції провітрюють протягом 5 хвилин.

#### **5. Ознаки гострого отруєння. Заходи першої допомоги при отруєнні**

5.1. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі.

У разі випадкового потрапляння препарату в очі потрібно промити їх проточною водою та звернутися до лікаря.

5.2. Заходи першої допомоги у разі попадання засобу в шлунок.

У разі випадкового потрапляння препарату у шлунок потрібно промити його водою та в разі потреби звернутися до лікаря.

#### **6. Пакування. Транспортування. Зберігання**

6.1. Пакування засобу

Дезінфікуючий засіб «Ласепт 344» упакован в оригінальну тару підприємства-виробника: у полімерні флакони або пляшки 500 мл, 1000 мл або в поліетиленові каністри 5, 10 л.

6.2. Умови транспортування засобу

Транспортування та зберігання засобу - згідно з ГОСТ 9980.5. Умови транспортування та зберігання - по групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150.

6.3. Термін та умови зберігання засобу

Термін придатності препарату у каністрах - 3 роки з дати виготовлення. Засіб зберігають у закритих складських приміщеннях при температурі від 5 °C до 25 °C. Не потребує спеціальних умов зберігання. Зберігати в місцях, недоступних для дітей.

Концентрат засобу, який прийшов в непридатність для застосування, розводять водою з наступним скиданням в каналізацію або методом захоронення згідно з вимогами СНиП 2.01-28, ДСанПіН 2.2.7.029.

#### **7. Методика контролювання**

7.1. Контрольовані параметри і норми

За показниками якості засіб «ЛАСЕПТ 344» повинно відповідати вимогам і нормам, вказаним у таблиці 3.

**Таблиця 3. Показники якості та норми дезінфекційного засобу «ЛІАСЕПТ 344»**

Найменування показника	Норма
1. Зовнішній вигляд	Прозора рідина від безбарвної до жовтого кольору зі слабким специфічним запахом
2. Густина	$1,01 \pm 0,1$
3. Показник активності водневих іонів (рН) засобу	$12,0 \pm 1,0$
4. Масова частка додецилбіспропілентриаміну, %	9,0-11,0
5. Масова частка четвертинних амонієвих сполук, %	18,0-22,0

## 7.2. Визначення зовнішнього вигляду і запаху

Зовнішній вигляд засобу визначають візуально. Для цього в пробірку або хімічний стакан з безбарвного прозорого скла із внутрішнім діаметром 30-32 мм наливають засіб до половини і переглядають в світлі, що проходить.

Запах оцінюють органолептично.

## 7.3. Визначення водневого показника (рН) засобу

Значення pH засобу вимірюють за допомогою pH-метра.

## 7.4. Визначення густини

Густину (20 °C) вимірюють за допомогою пікнометра або ареометра.

## 7.5. Визначення вмісту додецилбіспропілентриаміна

Визначення вмісту додецилбіспропілентриаміну проводять титриметричним методом.

### 7.5.1. Засоби вимірювання, реактиви, розчини:

ваги лабораторні ГОСТ 24104 2 класу точності з найбільшою межею зважування 200 г;

бюретка 1-3-2-50-0,1;

колба конічна типу Кн 1-250-24/29 по ГОСТ 25336;

циліндр мірний 1-3-50 за ГОСТ 1770;

кислота соляна за діючою НД; 0,1 н водний розчин;

індикатор бромфеноловий синій, ч.д.а. по ТУ 6-09-1058; 0,1 % розчин в 50 % водно - спиртовому розчині;

спирт ізопропіловий, марки х.ч. по ТУ 6-09-402 або еквівалентної чистоти;

вода дистильована згідно з ГОСТ 6709.

### 7.5.2. Проведення аналізу

Наважку засобу масою 1,0-2,0 г. взяту з точністю до 0,0005 г., кількісно переносять у конічну колбу місткістю 250 см<sup>3</sup>, додають 50 см<sup>3</sup> ізопропілового спирту, 0,5 см<sup>3</sup> розчину індикатору бромфенолового синього та титрують 0,1 н розчином соляної кислоти до переходу синього забарвлення розчину в жовте.

### 7.5.3. Обробка результатів

Вміст додецилбіспропілентриаміна (Х) у відсотках обчислюють за формулою (1)

$$X = \frac{0,00997 \times V \times K \times 100\%}{m}$$

де 0,00997 - маса додецилбіспропілентриаміна, що відповідає 1 см<sup>3</sup> розчину

соляної кислоти з концентрацією 0,1 н;

V - об'єм розчину соляної кислоти з концентрацією 0,1 н, витрачений на

титрування, см<sup>3</sup>;

K - поправочний коефіцієнт розчину соляної кислоти з концентрацією 0,1 н;

m - маса проби, г.

### 7.6. Визначення вмісту ЧАС (сумарно)

Методика заснована на методі двофазного титрування. Четвертинні амонієві сполуки титрують за допомогою аніонного стандартного титру (натрій додецилсульфат) при додаванні індикатора з аніонного барвника (метиленового блакитний). Титрування проводиться в двофазній системі (вода та хлороформ).

#### 7.6.1. Обладнання, матеріали, реактиви:

Ваги лабораторні загального призначення 2 класу точності за ГОСТ 24104 з найбільшою межею зважування 200 г;

Колба Кн 1-250-29/32ТХС за ГОСТ 25336 зі шліфованою пробкою;

Бюретка 1-3-2-25-0,1 за ГОСТ29251;

Натрій додецилсульфат за ТУ 6-09-64; 0,004 н водний розчин;

Натрію сульфат десятиводний, ч.д.а. за ГОСТ 4171;

Метиленовий блакитний (індикатор) за ТУ 6-09-29, ч.д.а.;

Хлороформ за ГОСТ 20015, ч.д.а.;

Кислота сірчана за ГОСТ 4204, ч.д.а.;

Цетилперідиній хлорид 1-водний із вмістом основної речовини не менше

99 % виробництва фірми «Мерк» (Німеччина) або реактив аналогічної

кваліфікації за чинною нормативною документацією; 0,004 н водний

розвин;

Вода демінералізована або дистильована за ГОСТ 6709

#### 7.6.2. Підготовка до аналізу

7.6.3. Приготування розчинів індикатора, цетилперідиній хлориду та додецилсульфату натрій:

- Для одержання розчину індикатора в мірну колбу місткістю 1 дм<sup>3</sup> вносять 30 см<sup>3</sup> 0,1 % водного розчину метиленового синього, 7 см<sup>3</sup> концентрованої сірчаної кислоти, 110 г натрію сульфату десятиводного і доводять об'єм дистильованою водою до 1 дм<sup>3</sup>.

0,004 н розчин цетилпіридиній хлориду готують розчиненням наважки 0,146 г. цетилпіридиній хлориду 1-водного, взятої з точністю до 0,0002 г, в дистильованій воді в мірній колбі ємністю 100 см<sup>3</sup> з доведенням об'єму води до мітки.

-0,004 Н розчин додецилсульфату натрію готують розчиненням наважки 0,116 г. додецилсульфату натрію, взятої з точністю до 0,0002 г, в дистильованій воді в мірній колбі місткістю 100 см<sup>3</sup> з доведенням об'єму води до мітки.

#### 7.6.4. Визначення поправочного коефіцієнту 0,004 н розчину додецилсульфату натрію.

У колбі місткістю 250 см<sup>3</sup> до 10 см<sup>3</sup> розчину додецилсульфату натрію додають 40 см<sup>3</sup> дистильованої води, потім 20 см<sup>3</sup> розчину індикатора та 15 см<sup>3</sup> хлороформу, утворену двофазну систему титрують розчином цетилпіридиній хлориду при інтенсивному струшуванні (з закритою пробкою) колбі до знебарвлення нижнього хлороформного шару. Титрування проводять при денному освітленні. Колір двофазної системи визначають в минаючому світлі.

#### 7.6.5. Проведення аналізу

Наважку засобу від 0,5 г. до 0,7 г., взяту з точністю до 0,005 г, розчиняють в мірній колбі місткістю 100 см<sup>3</sup> в дистильованій воді з доведенням обсягу до мітки. У конічну колбу місткістю 250 см<sup>3</sup> вносять 5 см<sup>3</sup> розчин додецилсульфату натрію, додають 45 см<sup>3</sup> дистильованої води, 20 см<sup>3</sup> розчину індикатора та 15 см<sup>3</sup> хлороформу. Після збовтування виходить двофазна рідка система з нижнім хлороформним шаром, забарвленим в синій колір. Її титрують приготовленим розчином засобу при інтенсивному струшуванні в закритій колбі до знебарвлення нижнього шару.

#### 7.6.6. Обробка результатів

Вміст ЧАС (Х, %) у відсотках обчислюють за формулою (2):

$$X = \frac{0,00144 \times V \times K \times 100 \times 100\%}{V_1 \times m}$$

Де: 0,00144 - середня маса алкілдиметилбензиламоній хлориду та

дидецилдиметиламоній хлориду, що відповідає 1 см<sup>3</sup> розчину додецилсульфату натрію з концентрацією 0,004 н;

V - об'єм розчину додецилсульфату натрію, що титрується, з концентрацією 0,004 н, 5 см<sup>3</sup>;

K - поправочний коефіцієнт розчину додецилсульфату натрію з концентрацією 0,004 н;

100 - коефіцієнти розведення аналізованої проби;

$V_1$  - об'єм розчину засобу, витраченого на титрування,  $\text{cm}^3$ ;

$m$  - маса проби, г.

7.7. Визначення одиниці пакування проводиться методом вимірювання не менше 10 пакувальних одиниць за допомогою мірних циліндрів, відповідного об'єму за діючою НД.

7.8. Визначення якості та відповідності пакування та маркування проводиться методом огляду відібраних зразків.

## **8. Контроль за відмиванням засобу дезінфікуючого «ЛАСЕПТ 344»**

Контроль залишку засобу дезінфікуючого «ЛАСЕПТ 344» на поверхні після відмивання виконується визначенням сумарної масової частки четвертинних амонійних сполук, яке проводять йодометричним методом. Сутність методу полягає у отриманні забарвлених комплексів четвертинних амонійних сполук. Метод має чутливість 10  $\mu\text{g}/\text{cm}^3$ .

8.1. Реактиви та їх приготування.

Йод кристалічний за ГОСТ 4159-79.

Спирт етиловий ректифікований технічний за ГОСТ 18300.

Готується 5 % - ний спиртовий розчин йоду (навіска йоду 5,0 г розчиняється в 95,0 г етилового спирту).

8.2. Проведення аналізу

Методика визначення змивання засобу полягає в наступному: у дві конічні колби об'ємом 250  $\text{cm}^3$  наливають по 150  $\text{cm}^3$  води: аналізований змивної (дослід) і води для ополіскування (контроль). У кожну колбу додають по 5  $\text{cm}^3$  5 % - ого спиртового розчину йоду і через 5 хв порівнюють колір з контролем. За відсутності в змивній воді залишків засобу розчин прозорий, золотисто-жовтого кольору, за наявності засобу в концентрації вище 10  $\mu\text{g}/\text{cm}^3$  розчин мутніє і набуває синьо-коричневий колір.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖАЮ

Міністерство охорони здоров'я України  
(назва установи)  
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601  
(місцезнаходження)  
253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.04. 2013р.

№ 05.03.02-04/ 24362

Дезінфекційний засіб „ЛАСЕПТ 344” (ліоці речовини, %: 10,0-додецилбіспропілентриамін; 13,0-алкілдиметилбензиламонію хлорид; 7,0-дідесилдиметиламонію хлорид)

код за ДКПП: 20.20.14

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Засіб «Ласепт 344» призначений для поточного, заключної, профілактичної дезінфекції, проведення генеральних прибирань у лікувально-профілактичних установах та вогнищах інфекційних захворювань бактеріального (включаючи туберкульоз), вірусного та грибкового стігології; дезінфекції виробів медичного призначення (включаючи хірургічні і стоматологічні інструменти, окрема жорсткі і гнуучі ендоскопи та інструменти до них); дезінфекції та очищення поверхонь, приміщень, меблів, санітарного транспорту, близниць, посуду, предметів догляду за хворими, санітарно-технічного обладнання, прибірального інвентарю; клінічних, біохімічних, бактеріологічних, серологічних та інших профільніх лабораторій; аптеках і аптечних установ; оздоровчих закладах (санаторії, профлакторії, будинки відпочинку); на підприємствах харчової промисловості (масложирові, хлібної, молочної, м'ясної, рибної, підприємствах з виробництва напоїв, птахопереробних підприємствах тощо); ресторанного господарства і торігівлі, споживчих ринках; транспорті (громадському, залізничному, морському, річковому, автомобільному), вокзалах, авіапортах, автостанціях, метрополітені; дезінфекції систем кондиціонування повітря; дезінфекції на комунальних об'єктах, спортивно-оздоровчих установах, пенітенціарних установах, хоспісах, установах зв'язку, банківських установах, військових частинах, дошкільних та навчальних закладах; приміщення, обладнання, інструменти в перукарнях, косметичних салонах і кабінетах; розважальніх комплексах; дезінфекції та миття громадських туалетів і бітуалетів, баків для сміття, сміттєзвіральнів.

(фото застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ АНТИСЕПТИКИ", Україна, 61204, м. Харків, вул. Ахсарова,17, к.64, тел.:  
755-32-27, код ЕДРПОУ: 38279992

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ АНТИСЕПТИКИ", Україна, 61204, м. Харків, вул. Ахсарова,17, к.64, тел.:  
755-32-27, код ЕДРПОУ: 38279992

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

для державної реєстрації в ДСЕС України

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Засіб за параметрами гострої токсичності відповідає до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества.

Класифікація і общиє требования безопасности відносяться до 3 класу небезпеки (помірно небезпечна речовина) при введенні в шлунок та до 4 класу небезпеки (малонебезпечна речовина) при нанесенні на шкіру; концентрат засобу володіє помірною місцево-подразнюючою дією на шкіру та слизові оболонки очей; робочі розчини засобу не володіють місцево-подразнюючою, шкірно - резорбтивною та сенсибілізуючою дією.  
Препарат не виявляє мутагенних, канцерогенних, тератогенних та гонадотропних властивостей.

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення**  
є:  
зберігання, транспортування і використання продукту здійснювати у відповідності з вимогами «Методичних вказівок щодо застосування дезінфекційного засобу „ЛАСЕПТ 344“ з метою дезінфекції та дестерилізаційного очищенні».

Засіб „ЛАСЕПТ 344“ володіє володіє антимікроною активністю відносно грамнегативних і грампозитивних бактерій (включаючи мікобактерії туберкульозу, збудників внутрішньоінфекцій і аеробних інфекцій), вірусів (включаючи аденоіруси, віруси грипу, парагрипу, «пташиного» грипу, «свинячого» грипу, збудників гострих респіраторних інфекцій: ентеровіруси, ротавіруси, вірус поліоміеліту, вірус ентеральних, парентеральних гепатитів, герпесу, атипової пневмонії, ВІЛ-інфекції та ін.) і грибів (збудників кандидозів і дерматофітій), пліснявих грибів; засіб володіє міочинами та дезодоруючими властивостями.  
Всі роботи з застосуванням засобу „ЛАСЕПТ 344“ слід проводити у спецодязі, захищаючи шкіру рук гумовими рукавичками. При обробці поверхонь способом зрошування рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання - універсальні респіратори марки РУ-60М або РПГ-67, очей - герметичні окуляри, шкіри рук - гумові рукавички.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Дезінфекційний засіб „ЛАСЕПТ 344“ (діючі речовини, %: 10,0-полецилбіпролінтриамін; 13,0-алкілдиметилбензиламонію хлорид; 7,0-діледцилдиметиламонію хлорид), за наданням заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: 3 роки.**

Етикетка вимагається

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 30.04. 2018 року (для державної реєстрації в ДСЕС України).**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфері застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордон)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@panu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net

(наименування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, WWW)

Протокол експертизи

№ 3009 від 18.03.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Чернок В.І.

для ПРИМІТОК

для ПРИМІТОК

